

CLASSIFICAÇÃO DOS TUMORES MALIGNOS  
SISTEMA T.N.M.

(da Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia)

NÃO RATIFICADO PELA U.I.C.C.

COLO

*Carcinoma pré-invasivo*

Estádio 0 :

Carcinoma in situ, carcinoma intra-epitelial. Casos de estágio 0 não deveriam ser incluídos em estatísticas terapêuticas.

*Carcinoma invasivo*

Estádio I :

Carcinoma estritamente limitado ao colo (havendo extensão para o corpo deve ser abandonado).

Estádio I<sub>A</sub> :

Casos de invasão precoce do estroma (carcinoma pré-clínico).

Estádio I<sub>B</sub> :

Todos os outros casos do estágio I.

Estádio II

Estende-se o câncer além do colo mas não atinge a parede pélvica. Envolve a vagina, porém não o terço inferior. É aconselhável subdividir o estágio

II em II<sub>A</sub> (sem comprometimento parametrial) e II<sub>B</sub> (com comprometimento parametrial).

Estádio III :

Atinge a parede pélvica. Ao toque retal não há espaço isento de câncer entre o tumor e a parede pélvica. O tumor envolve o terço inferior da vagina.

Estádio IV :

Estende-se além da pelve ou envolve a mucosa do reto e da bexiga.

ANOTAÇÕES PARA CONFERIR O  
ESTADIAMENTO

Só deve ser o caso rotulado I<sub>A</sub> após diagnóstico microscópico da invasão precoce do estroma realizada antes do tratamento planejado. O Estádio I<sub>A</sub> representa aquele grupo de casos de carcinoma que só pode ser diagnosticado microscòpicamente, após a biópsia. Foram freqüentemente chamados de microcarcinoma. Nos demais casos do estágio I é o diagnóstico clínico factível.

\* Realizada no Instituto Nacional de Câncer entre 4 e 9 de setembro de 1966.

\*\* Continuação do artigo sobre o mesmo assunto, publicado na Revista Brasileira de Cancerologia n.º 29 (1965).



mucosa da bexiga ou o reto. A presença de edema bolhoso é insuficiente para classificar o tumor como T<sub>4</sub>.

N<sub>x</sub> ou N<sub>0</sub>

Nódulos habitualmente inacessíveis à palpação.

M<sub>0</sub>

Metástases ausentes.

*Estádio IV-B :*

T<sub>1</sub>, T<sub>2</sub> ou T<sub>4</sub>, N<sub>x</sub>, N<sub>0</sub> ou N<sub>1</sub>, M<sub>1</sub>

Qualquer tumor descrito como T<sub>1</sub>, T<sub>2</sub>, T<sub>3</sub> ou T<sub>4</sub>; N<sub>x</sub>, N<sub>0</sub>, ou N<sub>1</sub>, em combinação com:

M<sub>1</sub>

Evidência clínica e/ou radiológica da metástase fora da pelve.

## RESUMO :

Estádio 0 :

T<sub>0</sub>, N<sub>x</sub> ou N<sub>0</sub>, M<sub>0</sub>.

Estádio I :

T<sub>1</sub>, N<sub>x</sub> ou N<sub>0</sub>, M<sub>0</sub>.

Estádio II :

T<sub>2</sub>, N<sub>x</sub> ou N<sub>0</sub>, M<sub>0</sub>.

Estádio III :

T<sub>3</sub>, N<sub>x</sub> ou N<sub>0</sub>, M<sub>0</sub>.

Estádio IV-A :

T<sub>4</sub>, N<sub>x</sub> ou N<sub>0</sub>, M<sub>0</sub>.

Estádio IV-B :

Qualquer combinação de T ou de N com M<sub>1</sub>.