



HOSPITAL
HAROLDO JUAÇABA

Ribociclibe

Succinato de Ribociclibe (KISQALI ®)

Cartilha de orientações farmacêuticas para
pacientes e seus cuidadores



Ribociclibe: 200 mg 400 mg 600 mg

Nome do Paciente:

ORIENTAÇÕES DE USO

Querido paciente.

Nesta cartilha, você encontrará a resposta para as suas principais dúvidas quanto ao uso do Ribociclibe (KISQALI ®).

Leia atentamente este material e consulte-o sempre que achar necessário.



1

O que devo saber antes de iniciar meu tratamento?

O Ribociclibe (Kisqali®) é indicado para pacientes com um tipo de câncer de mama sensível a hormônio (RH+/HER2-), que esteja localmente avançado ou que já tenha se espalhado para outras partes do corpo (metastático).



Se você tiver alguma dúvida de como este medicamento funciona ou por que ele foi prescrito para você, pergunte ao seu médico ou farmacêutico.

2

Quando não devo usar este medicamento?

Em caso de alergia a amendoim, soja, ou qualquer componente deste medicamento.


3

Como devo usar este medicamento?

O Ribociclibe deve ser tomado conforme a prescrição médica:

Se sua dose for de

600 mg



03 comprimidos,
uma vez ao dia

Se sua dose for de

400 mg



02 comprimidos,
uma vez ao dia

Se sua dose for de

200 mg



01 comprimido,
uma vez ao dia

Os comprimidos devem ser tomados **no mesmo horário, preferencialmente pela manhã**, com um copo de água, antes ou após as refeições, durante 21 dias.



Os comprimidos devem ser engolidos inteiros, logo, não podem ser partidos, esmagados ou mastigados.

4

O que devo fazer em caso de esquecimento?

Se você esquecer de tomar seus comprimidos, ou ainda, se você vomitar após a tomada dos comprimidos, pule a dose perdida daquele dia e tome a próxima dose no horário habitual.



DICA: Coloque um lembrete no seu celular para lhe avisar do horário de tomar o seu medicamento!

5

Quais efeitos colaterais este medicamento pode causar?

O Ribociclibe pode causar queda de cabelo, tontura e dor de cabeça, fraqueza e cansaço, erupções na pele e coceira, tosse e falta de ar, redução do apetite e perda de peso, aftas na boca, azia, náuseas e vômitos, dor abdominal, constipação ou diarreia, inchaço nos braços e nas mãos ou nas pernas e nos pés, anemia e redução das células de defesa (neutropenia).



Em caso de febre (igual ou maior que 37,8°), busque atendimento médico o mais rápido possível!

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Alguns medicamentos e suplementos podem interferir no efeito do Ribociclibe, por exemplo:

- *Azitromicina, Claritromicina, Eritromicina*
- *Ciprofloxacino, Levofloxacino*
- *Rifampicina*
- *Cloroquina*
- *Cetoconazol, Fluconazol, Itraconazol, Voriconazol*
- *Indinavir, Lopinavir, Ritonavir, Saquinavir, Telaprevir, faviprenavir*
- *Amiodarona, Verapamil*
- *Fenitoína, Carbamazepina*
- *Haloperidol, Quetiapina*
- *Fentanil, Metadona*



- *Erva de São João*



- *Grapefruit (Toranja)*
- *Romã*



Antes de iniciar o tratamento com o Ribociclibe, certifique-se de informar seu médico e farmacêutico sobre os medicamentos e suplementos que esteja tomando, e não esqueça também de informar sobre os chás que tem costume de fazer uso.

CUIDADOS IMPORTANTES



Mantenha o medicamento em sua embalagem original.

Este medicamento deve ser armazenado em geladeira, longe do alcance de crianças.



Respeite **sempre o horário**, a dose e a duração do seu tratamento!

Atente-se aos exames solicitados (hemograma + TGO/TGP + eletrocardiograma) e mostre-os para o seu médico, durante a consulta, e para o farmacêutico, no momento da entrega do medicamento.



A realização de exames é fundamental para o monitoramento adequado do seu tratamento!

Nunca interrompa o seu tratamento sem o conhecimento do seu médico ou farmacêutico!

É muito importante que você siga todas as instruções fornecidas, para o sucesso do seu tratamento!



Caso restem dúvidas, especialmente sobre a entrega do medicamento, disque o número abaixo:



NOVARTIS: 0800 776 6300