

Material Suplementar Etapa 1 – Resultados do Inquérito dos principais insumos e procedimentos apontados pelos fisioterapeutas			
Complicações do tratamento do CM	Insumos Mínimos Utilizados ao Diagnóstico	Procedimentos utilizados na prevenção e tratamento	Insumos mínimos para exercícios fisioterapêuticos na prevenção e tratamento
Fadiga Oncológica, Perda de massa óssea, sarcopenia	Fisioterapeuta especializado 91,7%; Questionários específicos 81,3% Escala Visual Analógica e Material impresso 37,5%	Técnica de conservação de energia 95,8%; Exercícios fisioterapêuticos 31,3%	Espaço físico 89,6%; Theraband 83,3%; Halter e Bastão 72,9%; Caneleira 70,8%; Cicloergômetro 68,8%; Colchonete 66,77%; Bola Suíça 45,8%; Esteira 39,6%; Bicleta ergométrica 35,4%; Plataforma vibratória 20,8%; Bambolê 16,7%
Neuropatia Periférica	Exame físico sensibilidade 93,8%; Anamnese 85,5%; Questionário específico 60,4%; Testes funcionais 56,3%; Estesiômetro 54,2%; Cadeira 25%	Exercícios Fisioterapêuticos 91,7%	Acupuntura 75%; Espaço Físico 72,9%; Theraband 45,8%; Fotobiomodulação, bambolê e bolas 39,6%; Halter 37,5%; bola suíça 29,2%; Tens 18,8%
Radiodermite	Espaço Físico 72,9%; Impressos 37,55%	Biofotomodulação 87,5%; Exercícios fisioterapêuticos e Terapia Manual 43,8%	Laser 85,4%; Espaço Físico 70,8%, Ficha de avaliação 43,8%
Edema e linfedema pós-operatório	Fita métrica 100%; Ficha de avaliação específica 91,7%; Mesa e cadeira 68,8%	Orientação quanto aos cuidados com a pele 97,9%; Cinesioterapia específica para membros superiores 95,8%	Espaço físico 83,3%; Luva Compressiva 70,8%; Bolas /bastão/bambolê 60,4%; Colchonete 25%
Dor	Escala Visual analógica 97,8%; Exame Físico 93,8%; Impressos 37,5%	Terapia manual 100%; Exercícios Fisioterapêuticos 93,8%; Eletroterapia 81, 3%; Bandagem neuromuscular 75%; Acupuntura 72,9%; Termoterapia 45,8%	Espaço físico 79,2%; Fotobiomodulação 62,5%; TENS 77%; Bandagem Neuromuscular 66,7%; Bolsa Gel 62,5%; Agulhas 54,2%; Bastão 52,1%; Bola suíça 37,5%; Colchonete 35,4%; Theraband 33,3%; Halter 31,3%;

Alterações Cicatricais	Exame Físico 97,9%; Impressos 29,2%	Orientação 97,9%; Cinesioterapia e Terapia manual 85,4 %; Bandagem neuromuscular 70,8%; Eletroterapia 25%	Fotobiomodulação 81,3%; Espaço físico 70,8%; bandagem neuromuscular 64,6%; Gancho 54,2%; Bamboles e bolas 33,3%; bastão 20,8%; Colchonete 18,8%; Theraband 14,6%
Lesões de nervos periféricos (sensitivos e motores)	Exame Físico 100%; Materiais específicos: pincel, agulha e estesiômetro 66,7%; Martelo de reflexo 60,4%; Eletro-neuromuscular 33,3%; pincel, agulha 31,3%	Cinesioterapia 100%; Orientação 93,8%; Eletroterapia 83,3%	Exame físico 100%; Goniômetro 85,4%; Questionário específico 41,7% Fita Métrica 29,2%; Impressos 27,1%
Restrição de amplitude Articular	Exame físico 100%; Questionário específico 41,7%; Fita métrica 29,2%; Impressos 27,1%	Cinesioterapia 100%; Orientação e Terapia manual 95,8%	Espaço físico 85,4%; Bastão 77,1%
Perda da funcionalidade	Exame físico 95,8%; Anamnese e Escala de Performance de Karnovsky 91,7%; Impressos 27,1%	Exercícios Fisioterapêuticos e orientações 100%; Adaptação das AVDs 97,9%	Exercícios Fisioterapêuticos 100%; Órteses e próteses 77,18%
Dispneia	Exame Físico 91,7%; Escala de Borg Modificada 89,6%; Estetoscópio e Oxímetro 87,5%	Posicionamento 93,8%; Orientações 91,7%; Técnica de conservação de energia 83,3%; Técnicas de relaxamento 77,1%; Manobras de higiene brônquica, Terapias Integrativas 56,3%	Técnicas Respiratórias e posicionamento 93,8%; orientações 89,6%; Técnica de conservação de energia 81,3%; Espaço físico 72,9%; Manobra de higiene brônquica 62,5%; Ventilação não invasiva 54,2%; Ventilador (eletrodoméstico) 33,3%